

**Заключение:**

Значительно расширены оба предсердия, наиболее резко правое. Умеренно расширен ПЖ. Умеренно утолщен миокард ЛЖ и ПЖ.

Признаки нарушения диастолической функции обоих желудочков.

Сократительная функция миокарда желудочков сохранена.

Трикуспидальная регургитация 2-3 ст с ГСД 25-30 ммртст. ЦВД около 15 ммртст. СДЛА соответственно 40-45 ммртст.

Выраженная гепатомегалия. Расширены ПВ - 15 мм и НПВ - 18 мм, на вдохе коллабирует до 50%.

Тромбы в полостях сердца не визуализируются.

Жидкости в бр. полости, в полости перикарда и в плевральных полостях нет.

ЭХОКГ данные за рестриктивную кардиомиопатию. Недостаточность трехстворчатого клапана 2-3 ст. Умеренная легочная гипертензия.

25.04.2014 **ЭКГ 12**

**Заключение:** Ритм синусовый, 89 уд. в мин. Вертикальная ЭОС. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭКГ-признаки гипертрофии ПП и ЛЖ с элементами систолической перегрузки.

28.04.2014 **Трансторакальная эхокардиография**

**Заключение:**

В динамике: ПП - 52 x 58 мм. ЛП - 29 x 50 мм. ЛП ПЗР - 36 мм. ТР 2-3 ст, ГСД 20 ммртст. ЦВД 15 ммртст. СДЛА 35 ммртст - снизилось на 10 ммртст. МР - 1 ст. Восх. аорта - 16 мм. КДР ЛЖ - 32 - 34 мм, ФВ ЛЖ - 62%. ПЖ - 20 мм. Ствол ЛА - 19 мм.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ****1. Биохимический анализ крови**

Показатель	АЛТ	АСТ	Бил-н об	Гл	Бел	Моч	К	Na	Mg i	Ca i
Дата провед.	Е/л	Е/л	мкмоль/л	ммоль/л	г/л	ммоль/л	ммоль/л	ммоль/л	ммоль/л	ммоль/л
23.04.14 12:28	17	31	36	9,1	67	4,8	3,6	141	0,52	1,17

**2. Общий анализ крови (+СОЭ)**

Показатель	Лейк-ты	Эр-ты	Г-бин	Цв/п	Г-крит	Тром-ты	СОЭ	Эоз	Эоз10*9	Нейт/пал	Нейт/п	Нейт/сер	Нейт/с	Лимф
Дата провед.	(10 <sup>9</sup> /л)	(10 <sup>12</sup> /л)	г/л		%	(10 <sup>9</sup> /л)	мм/ч	%	(10 <sup>9</sup> /л)	%	(10 <sup>9</sup> /л)	%	(10 <sup>9</sup> /л)	%
23.04.14 17:11	8,8	4,4	127	0,866	38,9	243	2	4	0,352	1	0,088	51	4,488	42
	Лимф	Мон	Моноц											
	(10 <sup>9</sup> /л)	%	(10 <sup>9</sup> /л)											
	3,696	2	0,176											

**3. Анализ на группу крови и резус-фактор**

Показатель	Гр к	Рез
Дата провед.		
23.04.14 14:20	0 (I)	отрицат.

**Рекомендации:** 1. Наблюдение кардиолога по месту жительства.

2. Ограничение физических нагрузок.

3. Продолжить лечение СН: фуросемид 15 мг x 2 р. в сут. (при увеличении в динамике размеров печени и появлении отеков дозу увеличить), верошпирон 12,5 мг x 2 р. в сут., эналаприл 0,0005 x 2 р. в сут., карведилол 0,003125 x 2 р. в сут., силденафил 10 мг x 3 р. в сут., кардиомагнил 75 мг x 1 р в сут.

4. Противопоказаний для трансплантации сердца нет, абсолютных показаний для трансплантации в настоящее время сердца нет, имплантации устройства вспомогательного кровообращения не требуется,

5. Контрольный осмотр в ДКХЦ РНПЦ "Кардиология" через 2 мес.

Дата формирования **28.04.2014**

Зам.директора по детской кардиохирургии **Дроздовский К.В.**

Лечащий врач **Горустович А.В.**

Зав. отделением **Дедович В.В.**